



BlueN™ er et unikt produkt, der giver roerne et ekstra kvælstofbidrag gennem hele vækstsæsonen og dermed maksimerer udbyttepotentialet.

HVAD KAN BlueN BIDRAGE MED?

- BlueN er en kilde til supplerende bæredygtigt kvælstof uden for kvotesystem og potentielle CO₂ afgifter.
- BlueN øger roens modstandskraft, klorofylindhold og den vegetative vækst.
- BlueN kan øge udbyttepotentiale og afgrøde kvalitet.

HVAD ER BlueN?

BlueN indeholder den naturligt forekommende levende Methylobakterie, som inde i roens blade optager kvælstof fra luften og omdanner det til plantetilgængelige kvælstofforbindelser. Foruden roer anbefales BlueN i en lang række afgrøder, herunder bl.a. i majs, raps, kartofler mv. (se etiketten).

HVORDAN VIRKER BlueN?

1. BlueN trænger ind igennem roens blade, koloniserer bladet og følger med i roens nytilvækst.
2. BlueN omdanner kvælstof (N₂) fra luften til ammonium (NH₄⁺), og giver et konstant flow af kvælstof ind i roen.

Methylobakterier anvender methanol som energikilde. Methanol udskilles naturligt fra roen, og kræver derfor ikke yderligere energi fra planten.

ØGER EFFEKTIVITETEN AF KVÆLSTOF


BlueN er en bæredygtig, alternativ kilde til kvælstof, som reducerer afhængigheden af kvælstofoptag fra jorden og sikrer, at roen har adgang til kvælstof gennem hele vækstsæsonen.



BlueN UDBYTTEEFFEKT I ROER

- Data er baseret på 11 forsøg i de nordiske og baltiske lande i 2023-2024.
- Anvendelse af BlueN i en dosering på 333 g/ha øgede udbyttet af roer med 1,52 t/ha og sukkerudbyttet med 0,253 t/ha i gennemsnit af alle forsøg.

RELATIVT UDBYTTE



* Rodudbytte ubehandlet = 90,49 t/ha

* Sukkerudbytte ubehandlet = 15,09 t/ha



FORDELE OG AFGRØDEEFFEKT

- BlueN bidrager med ekstra kvælstof til roen.
- BlueN i roer har et stort potentiale, da vækstsæsonen er lang og dermed en lang virkningstid.
- Baseret på forsøg øger BlueN rodudbyttet med gennemsnitlig 1,52 t/ha.
- I samme forsøg øgede BlueN sukkerudbyttet med 0,253 t/ha.
- BlueN er også godkendt til økologisk jordbrug.

FAKTA OM BlueN i ROER

DOSERING	333 g/ha
VANDMÆNGDE	100-250 l/ha - benyt laveste vandmængde, hvis dug i afgrøden.
REGNFASTHED	Efter 1 time
BEHANDLINGSTIDSPUNKT	Fra 4 blade, BBCH 14
OPTIMALE BETINGELSER OMKRING UDBRINGNING	• Dagtemperatur $\geq 10^{\circ}\text{C}$ • Undgå frost 1 dag før og 2 dage efter udbringningen. • Roerne skal være i god vækst og ikke under (tørke)stress. • Morgensprøjtning foretrækkes.

Anvendelsestidspunkter ovenfor er vejledende og baseret på de bedste betingelser for kolonisering. BlueN bør udsprøjtes så tidligt som muligt i sæsonen, og så snart forholdene tillader det.



BLANDINGER MED ANDRE PRODUKTER

BlueN kan blandes med en række plantebeskyttelsesmidler, hvis tidspunktet for behandlingen er den samme. En samlet oversigt over blandbare midler og vejledning findes via link [her](#) eller via scanning af nedenstående QR kode.

Er den ønskede kombination ikke på listen, anbefales 24 timers interval mellem behandlingerne.



BlueN forhandles af



Scan her:

**KONTAKT**

Michael Vestergaard
Produktkonsulent
50 78 00 53



Frederik Christensen
Produktkonsulent
41 12 91 91



Emil Andersen
Produktkonsulent
50 78 00 90

Corteva Agriscience

Langebrogade 3H
1411 København K
Danmark